



Antecedentes médicos del campo médico de la **oncología**

1 Definición

El término caquexia describe una condición de pérdida de peso patológica. La pérdida de peso dramática que ocurre como resultado de una enfermedad tumoral avanzada se conoce como caquexia.

2 Prevalencia

Hasta 80 % de los pacientes con una enfermedad tumoral avanzada pueden ser afectados, alrededor de 20-30 % de ellos mueren de caquexia.

3 Diagnóstico

Uno puede hablar de caquexia si debido a una enfermedad:


- Se pierde más de 5 % del peso corporal dentro de un periodo de seis meses
- El IMC baja por debajo de 20.00 kg/m² y la pérdida de peso excede el 2 %

4 Terapia

Puesto que en una etapa muy avanzada solamente se pueden utilizar tratamientos diseñados para calmar los síntomas, los expertos recomiendan iniciar un tratamiento adecuado tan pronto como en la etapa de pre-caquexia.

5 Beneficios ofrecidos por seca mBCA

En análisis vectorial de impedancia bioeléctrica (BIVA) ayuda a detectar la caquexia y permite monitorear la gravedad en el curso de la terapia. El hecho de que los valores del paciente estén en el área de masa celular corporal baja es una indicación de caquexia.



El gráfico de composición corporal (BCC) permite el diagnóstico de sarcopenia. La sarcopenia significa masa libre de grasa (MLG) baja o masa muscular esquelética baja (MME).

